# Ludwig Herms

## Staudengärtnerei

## Eutin-Holstein

Neudorf 1



# Preisliste

1930

# Hinweis

Der Abkürzungs-Schlüssel befindet sich auf dem umgelegten Streifen des Umschlages

# Ludwig Herms

Staudengärtnerei

## Eutin-Holstein

Neudorf 1

# Zur Einführung

Die meisten Stauden besitzen eine große Anpassungsfähigkeit und ihre Widerstandskraft und Zähigkeit lassen uns zur Abänderung erkannter Fehler oder falscher Behandlung genügend Zeit. Je mehr die Ansprüche der Pflanzen berücksichtigt werden, desto leichter und erfolgreicher ist ihre Pflege. Gartenkultur beginnt bei der Herrichtung des Bodens.

In dem Verzeichnis wurden Angaben über den Standort gemacht, der für die Pflanze am geeignetesten ist. Außer der Höhe der Stauden und ihrer Blütezeit ist auch ihre Breitenentfaltung angegeben. Diese Zahlen gelten für eine voll entwickelte Pflanze — oder bei kriechenden Stauden für eine Fläche, die zur Entfaltung ihrer Schmuckwirkung benötigt wird.

Alpenpflanzen verlangen zumeist einen durchlässigen humosen Boden. Die Lockerung des Bodens, der Mangel an Humus kann leicht durch feinen Torfmull erreicht oder ersetzt werden. Die Anwendung von Torfmull, bei schwerem Boden auch scharfer Sand, bedeutet bei geringen Kosten außerordentlichen Erfolg.

Durch ihren Wuchs eignen sich besonders zur Bepflanzung von Sonderbeeten oder Steingärten die mit : bezeichneten Arten. Unter Anlehnung an die gemachten Standortsangaben gedeihen sie überall leicht. Besonders sorgfältige Pflanzung verlangende, oder nur in Sonderstellung zur Wirkung kommende Pflanzen, wurden mit ! bezeichnet.

Unter sh ist ein lockerer humoshaltiger Boden zu verstehen. Mit C ist Bauschutt, Schotter oder steinig-kiesige Beimischung bezeichnet. Durch Schotterbeimischung wird Durchlässigkeit erreicht, jedoch Feuchtigkeit in der Tiefe erhalten. Für einen Standort in steinigem Terrain oder zwischen Steinen gilt F. Die hier stehenden Pflanzen bedecken oder überwachsen mit ihren Polstern die Felsen und der Reiz ihres Wuchses kommt zur vollen Entfaltung. Wichtig ist die Beobachtung des Wurzelhalsschutzes bei den mit D bezeichneten Pflanzen. Entweder betten wir den Wurzelhals in eine Kiesschicht, oder wir setzen die Pflanze in einen senkrechten Felsspalt, wo die Feuchtigkeit sofortigen Abzug findet. Bei Knollen und Zwiebeln ist in ca. 20 cm Tiefe eine etwa 15 cm starke Kiesschicht anzulegen.

Beschattung (B) gilt im Besonderen bei : bezeichneten Arten. Die Pflanzen stehen im Schutz kleiner Sträucher, Zwergfichten usw., oder wir wählen einen Standort, der zur Mittagszeit im Schatten großer Felsen, Bäume oder Großsträucher liegt. Bei Saxifragen und Primeln ist in diesem Fall ein östlich oder nördlich geneigter Hang am geeignetesten.

Die Verwendung der Stauden hängt zu einem Teil von den gegebenen Verhältnissen ab, sonst aber entscheidet nur das richtige Gefühl für Wirkung und Zusammengehörigkeit.

Zu beachten ist, daß Tropffall hoher Bäume ausgesprochenen Alpenpflanzen in jedem Fall schadet. Zur Erhaltung mäßiger Feuchtigkeit, bei langer Trockenheit im Sommer, kann der Boden mit Sphagnum belegt werden. (Festlegen mit kleinen Steinen.) Diese Decke bildet zugleich eine Fanggrube für Schnecken. Sphagnum wird klein zerrissen der Erde beigemischt, um regelmäßige Frische, bei größter Lockerheit des Bodens, zu erreichen. Ausgelichtete oder verdorrte Stellen in Rasen und Polster werden mit feingesiebter Erde leicht aufgeschüttet. Besondere Kalkbeigabe hat bei kalkfliehenden Pflanzen zu unterbleiben. Moorerde, Torfmull und Sand sind hier in stärkerer Beimischung erforderlich. Bei der Pflanzung darf einer einmaligen guten Wässerung in den nächsten Tagen nur ein leichtes Ueberbrausen folgen. Gegen austrocknende Winde schützen wir die junge Pflanzung durch Fichtenreiser, durch Ueberdeckung mit Sack- oder Schattenleinen, oder durch Bedeckung des Bodens mit Laub, Torfmull oder Sphagnum. In der Voraussetzung maßvoller Anwendung wird zur Düngung empfohlen: Lützeldünger; für kleinere Flächen und für Alpenpflanzen Albert's Nährsalz, A. G. oder W. G., Hornspäne und Kalk. Kuhdung ist für alle Fälle der beste. Die Anwendung soll bis Ende Juni durchgeführt sein.

Zur Anleitung für die Pflege der Stauden werden folgende Bücher empfohlen: Erich Wocke: Kulturpraxis der Alpenpflanzen, Verlag Parey. Ernst Graf Silva Tarouca: Unsere Freilandstauden, Verlag G. Freytag.

Die Pflanzen werden beim Versand mit Namen, auf Holzetiketten geschrieben, bezeichnet.

Aluminium-Schilder zum Beistecken, 15 mm breit, 16 cm lang, kosten

| | | |
|---|---|---|
| bis 10 Stück | . . . . . . . | à 8 Rpf |
| „ 50 „ | . . . . . . . . | „ 7 „ |
| „ 100 „ | . . . . . . . . | „ 6 „ |

Bleistiftschrift erhält sich auf Aluminium jahrelang leserlich.

Die Gärtnerei liegt an der Plönerlandstraße (Nr. 1) und ist vom Bahnhof Eutin in 12 Minuten zu erreichen.

# Verkaufs-Bedingungen

**Bankkonto: Provinzialbank, Eutin**
**Postscheckkonto: Hamburg 34319**

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren die Preise der bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die Preise der Liste gelten in Goldmark. 1 Goldmark = 10/42 Dollar USA. Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei in Mark und Pfennig, ohne Skonto und Porto-Abzüge. Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Neudorf, Gerichtsstand Eutin.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art und Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10%, in gleicher Weise bei 25 Stück und mehr um 20%. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. An mir unbekannte Besteller versende ich nur gegen Nachnahme. Die Verpackung wird auf das zweckmäßigste und sorgfältigste ausgeführt und kommt zu den Selbstkosten in Anrechnung und wird nicht zurückgenommen.

Bei etwaigem Fehlen einzelner Sorten wird gleichwertiger Ersatz gegeben, wenn dieser nicht ausdrücklich verbeten ist. Die Erledigung der Aufträge geschieht in der Reihenfolge des Eingangs so schnell wie möglich. Eine Garantie für das Anwachsen der Pflanzen, welches von der Pflanzung, den Bodenverhältnissen und der Pflege abhängig ist, wird nicht übernommen.

Um unnötige Verzögerungen oder Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um genaue und deutliche Angabe der Anschrift. Außer der Poststation ist stets die Bahnstation (Eilgutbahnhof), unter Berücksichtigung der bei Kleinbahnen benötigten Uebergangsstation, anzugeben.

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| : **Acaena,** Stachelnüßchen S B H sh tr—f RZ ww | | | | |
| Buchananii, helles-silberblaugrünes Laub . . | 70 | 3 | | 40 |
| glauca, blaugrün . . . . . . . . . . . . | | 10 | | 40 |
| novae-zeelandiae, blaugrün . . . . . . . . | | 15 | | 40 |
| ! microphylla, braungrün . . . . . . . . . | | 3 | | 50 |
| : ! **Acantholimon,** Stechnelke SS tr D C FF T | | | | |
| glumaceum, hellrosa; stachligstarre Polster | 30 | 15 | 7—8 | 80 |
| **Achillea,** Schafgabe SS tr d | | | | |
| filipendulina, Parker's Var. goldgelbe Dolden | 80 | 90 | 7—8 | 60 |
| mongolica hybrida, rahmweiß; frischgrün . | 60 | 50 | 6 | 70 |
| : millefolium Kelway, tiefrot . . . . . . . | 50 | 40 | 7—8 | 40 |
| : § clavennae, weiß; silbergrau, SS tr C F . . . | 30 | 20 | 6—7 | 50 |
| : Kellereri, weiß; silbergrau, feinlaubig, C F . | 25 | 15 | | 50 |
| : tomentosa, gelb; frischgrün, feinlaubig, C F | 25 | 10 | | 50 |
| **Aconitum,** Eisenhut S B ml | | | | |
| napellus, tiefblaue dichte Rispen . . . . . . | 50 | 110 | 7—8 | 50 |
| bicolor, blauweiß . . . . . . . . . . . | | | | 60 |
| carneum, zart fleischfarbigrosa . . . . . | | | | 60 |
| Fischeri, reinblau . . . . . . . . . . . . | 30 | 60 | 8 | 70 |
| Wilsonii, lichtblaue lange Rispen . . . . | 50 | 140 | 8—9 | 80 |
| Spark's Var., tiefblaue lockere breite Rispen . | 50 | 140 | 7—8 | 60 |
| : **Adonis,** Adonisröschen S sh tr o k | | | | |
| § amurensis, goldgelb; feingeschlitzt . . . . | 25 | 20 | 2—3 | 120 |
| vernalis, goldgelb; noch feiner zerschlitzt . | | | 4—5 | 50 |
| : ! **Aethionema,** saxatile, Steinkresse SS tr C FF | | | | |
| silbergrüne Blätter, zierende Früchtchen . . . | 15 | 15 | 5—8 | 40 |
| : **Allium,** Lauch S sh o tr D | | | | |
| cyaneum, lila; nickend . . . . . . . . . | 15 | 25 | 7 | 50 |
| pulchellum, lilarot . . . . . . . . . . . | 15 | 25 | 7—8 | 50 |
| § karatawiense, weißrötlich . . . . . . . | 10 | 15 | | 50 |
| § ostrowskianum, violettrot . . . . . . . . | 10 | 20 | | 25 |
| : **Alsine,** Felsenmiere S sh tr C F | | | | |
| banatica, kleine weiße Blüten, feinrasig R . | 30 | 15 | 6—7 | 40 |
| laricifolia, größere Blüten, dichtes Polster . | 30 | 10 | | 50 |
| liniflora } weiße Blüten frischgrüne Polster | 25 | 10 | 5—6 | 50 |
| verna | | | | 40 |
| Villarsii, | | | | 40 |
| : **Alyssum,** Steinkraut SS ssh tr C F FF | | | | |
| Moellendorfianum, gelb; niederliegende Triebe | 30 | 10 | 5—6 | 50 |
| montanum grdfl., gelb; etwas größer . . . | 30 | 15 | 5 | 50 |
| rostratum, dunkelgelb; üppig wachsend . . | 60 | 50 | 7 | 50 |
| saxatile, gelb; großblättrig . . . . . . . | 50 | 30 | 4—5 | 50 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| citrinum, bleichgelb . . . . . . . . . . | 50 | 30 | 4—5 | 50 |
| fl. pl., gefüllt, dunkel goldgelb . . . . . . | | | | 60 |
| : **Anchusa,** Ochsenzunge B H W o—m | | | | |
| Kaukasus-Vergißmeinnicht, tiefblau; große Blätter . . . . . . . . . . . . . | 60 | 40 | 4—5 | 60 |
| :! **Androsace,** Mannsschild S B sh tr k C F | | | | |
| Chumbyi } rosa Blütendolden auf ca. 10 cm hohem Stiel Rasen kleiner Rosetten | 30 | 10 | 5—6 | 60 |
| primuloides | | | | 60 |
| Watkinsii | | | | 70 |
| lanuginosa } Wuchs kriechend u. hängend | | | | 70 |
| Leichtlinii, F FF | | | | 70 |
| oculata | | | | 70 |
| Laggeri, B kleine feste Polster; kalkfliehend | 10 | 5 | | 70 |
| **Anemone,** Anemone, Windröschen | | | | |
| Frühlingsanemonen | | | | |
| : § blanda, B H sh blau und weiß } Blätter ziehen im Sommer ein | 20 | 20 | 3—5 | 50 |
| : § nemorosa Robinsoniana, B H W hellblau | 40 | 20 | 4—5 | 100 |
| : § Blue Bonnet, B H W großblumig, blau | | | | 150 |
| : § apennina, blau; B H sh | 25 | | | 30 |
| : demissa, S B sh, weiß . . . . . . . . . . | 25 | 30 | 5—6 | 100 |
| silvestris, S B H sh o k ww, große weiße Blüte | 50 | 30 | 5—6 | 50 |
| : Pulsatilla Formen: | | | | |
| alpina, weiß } B sh—hh f | | | | 80 |
| sulfurea, stumpfgelb | 20 | 25 | 5 | 80 |
| Burseriana, elfenbeinweiß | | | | 80 |
| albicyanea, blau getöntes Silberweiß S shl C tr k . . . . . . . . . . . . | 20 | 35 | 5 | 50 |
| amoena, tieflila . . . . . . . . . . . . . | 25 | 30 | 4—5 | 60 |
| montana, schwarzlila . . . . . . . . . . . | | | | 60 |
| var. rubra, tief braunrot . . . . . . . . | | | | 60 |
| hybr. Mrs. van der Elst, zart silberrosa . | | | | 300 |
| Herbstanemonen, S B shl m L | | | | |
| japonica Honorine Jobert, große weiße Blüte | 35 | 80 | 9—10 | 60 |
| Whirlwind, weiß; halbgefüllt . . . . . . | | | | 60 |
| Königin Charlotte, warm rosa . . . . . | | | | 70 |
| vitifolia tomentosa, zartrosa; winterhart . | | | | 80 |
| **Anaphalis** (Antennaria) margaritacea S o w weiße Immortellen-Blüte . . . . . . . . . . | 70 | 50 | 7—8 | 50 |
| : **Antennaria,** tomentosa, Katzenpfötchen S sh tr w Z R | | | | |
| Blüten silberwollig; silberweißfilzige Rasen . . | 30 | 10 | 6 | 30 |
| : **Anthericum** (Paradisea) Zaunlilie S B sh o tr | | | | |
| liliastrum giganteum } zierliche weiße Lilienblüte in einseitswendiger Aehre | 40 | 60 | 5—6 | 80 |
| major | 30 | 50 | | 60 |
| ramosum, Graslilie, Wuchs u. Blüte sehr zierlich | 30 | 30 | | 50 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| **Aquilegia,** Akelei S—B sh f m | | | | |
| haylodgensis Hybriden, in Farbenmischung | 35 | 70 | 6 | 45 |
| chrysantha, goldgelb . . . . . . . . . . . | | | | 50 |
| : **Arabis,** Gänsekresse S B tr o C F FF | | | | |
| albida, einfache weiße Blüte . . . . . . . . | 40 | 15 | 4 | 30 |
| fol. var., einfach; weißbuntblättrige Form | | | 4—5 | 50 |
| fl. pl., gefüllt blühend . . . . . . . . . | | | | 40 |
| alpina rosea, B, zart rosa . . . . . . . . | 30 | 10 | | 40 |
| ! androsacea, B sh k, weiß; niedrige Polster . | 25 | 6 | 5 | 50 |
| procurrens, B sh f w, weiß; schlanke Blütenstiele . . . . . . . . | 40 | 15 | | 40 |
| : **Arenaria,** Sandmiere | | | | |
| grandiflora, großblütig, weiß } S sh k C | 40 | 15 | 6—7 | 50 |
| montana, große Blüte, weiß } S sh k C | 40 | 15 | 6 | 50 |
| ! purpurascens, B sh C, zartrosa . . . . . . | 15 | 8 | 6—7 | 50 |
| rotundifolia, S B H W R Z f niedrigste weite Rasen . . . . . . . | | 5 | | 40 |
| : **Armeria,** Grasnelke S ssh o tr C F | | | | |
| leucocephala, sehr niedrig, weiße Blüten . . | 20 | 10 | 6 | 60 |
| maritima alba, weiß . . . . . . . . . . . | 25 | 20 | 6 | 30 |
| Laucheana, leuchtendrot . . . . . . . . | 25 | 20 | 5—6 | 30 |
| : **Arnica** sachalinensis, Wohlverleih S shl m f | | | | |
| Reichblühende Komposite, gelb . . . . . | 25 | 45 | 6—8 | 50 |
| **Artemisia,** Edelraute, Beifuß S B m f | | | | |
| lactiflora, weiße, reich verzweigte Rispen . . | 60 | 110 | 9—10 | 60 |
| **Aster** | | | | |
| : alpinus albus, weiß . . . . . S sshl o tr | 25 | 20 | 5 | 50 |
| giganteus, . . . . . . . . . . . . . . | | | | 60 |
| superbus, rosalila . . . . . . . . . . . | | | | 50 |
| Dunkle Schöne, dunkellila . . . . . . . | | | | 60 |
| : subcoeruleus floribundus, lavendelblau, großblütig . . . . . . . | 35 | 25 | 5—6 | 50 |
| Artemis, zartlila . . . . . . . . . . . . | | | | 50 |
| : yunnanensis, lilablau, gelbe Scheibe . . . . | 30 | 40 | | 70 |
| : lichiangensis, feinstrahligste lila Blüte schwarze Scheibe, Blütenstiel ca. 50 cm | 25 | 20 | 6 | 100 |
| : amellus, S shl m tr | | | | |
| Emma Bedau, ultramarinviolett . . . . | 50 | 50 | 8—9 | 80 |
| Gruppenkönigin, lavendelblau . . . . . | 40 | 40 | | 80 |
| King George, blauviolett . . . . . . . | 50 | 50 | | 120 |
| Oktoberkind, dunkelviolett . . . . . . . | 50 | 40 | 9—10 | 100 |
| Rudolf Goethe, lavendelblau . . . . . . | 50 | 50 | 8—9 | 100 |
| rubellus, lilarosa . . . . . . . . . . . | 50 | 50 | | 70 |
| Wienholzi, rosa . . . . . . . . . . . . | 50 | 60 | | 80 |
| : Thomsoni Winchmore Hill, lavendelblau . | 45 | 50 | 7—9 | 100 |
| : Frikarti, hellblau, breitverzweigte Büsche . . | 70 | 70 | 7—9 | 100 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| **Hohe Herbstastern** S m f B m | | | | |
| Blütenwolke, hellblau . . . . . . . . . . | 70 | 80 | 9 | 60 |
| Dickson, blau . . . . . . . . . . . . . . | | 100 | | 50 |
| Glühwürmchen, leuchtend rosa; verzweigte Rispen . . . . . . . . . | | 100 | | 60 |
| Herbstmyrte, zierliche weiße Sternchen . . | | 90 | | 50 |
| cordifolius Ideal, Wuchs u. Blüte zierlich; blau | | 80 | | 50 |
| Little Boy Blue, halbgefüllt, tiefblau . . . | 50 | 60 | | 100 |
| Marshall, leuchtend stahlblau . . . . . . . | 70 | 120 | | 50 |
| Nancy Ballard, dichtgefüllt, rosaviolett . . | | 100 | | 60 |
| Peggy Ballard, dichtgefüllt, lavendelblau . | | 100 | | 60 |
| Snowdrift, halbgefüllt, weiß . . . . . . . . | | 90 | | 70 |
| tardiflorus coeruleus, violett; straff gebaut | | 150 | 10 | 60 |
| **Astilbe,** Prachtspiere S ff m B H f (Torfmull) hh | | | | |
| Arendsi Amethyst, violett—purpur . . ca. | 70 | 80 | 7 | 70 |
| Bergkristall, reinweiß; schmale Rispen . . | | 100 | 7—8 | 70 |
| Diamant, reinweiß . . . . . . . . . . . | | 80 | 7 | 70 |
| Gloria, dunkelrosa; dichte Rispen . . . . | | 60 | 7—8 | 70 |
| Granat, dunkelkarmin; verzweigte Rispen | | 100 | | 80 |
| Hyacinth, leuchtend lilarosa . . . . . . | | 80 | | 70 |
| Lachskönigin, lachsrosa; perlartige Blüten | | 80 | | 70 |
| Kriemhilde, dunkellachsrosa . . . . . . | | 90 | | 70 |
| Rubin, dunkles Karmin . . . . . . . . . | | 90 | | 70 |
| Rosa Perle, rosa—farbige Perlblüten . . | | 80 | | 70 |
| Hybr. Betsy Cuperus, weiß mit rosa leicht überhängende Rispen . . . . . | | 150 | | 120 |
| Thunbergii elegans sosea, leuchtend rosa Hängerispen . . . . . . . . . . . . | | 100 | | 60 |
| rivularis (Spiraea barbata) cremefarben . | 150 | 170 | | 80 |
| Davidii, schmale Rispen; purpurrosa . . . . | 70 | 140 | | 70 |
| : hybrida crispa, B H sh f, rosa getönt krause, glänzend grüne Blätter . . . . | 25 | 15 | | 70 |
| : Däumling, hellrosa . . . . . . . . . . . | 25 | 15 | | 70 |
| : Liliput, hellrosa mit lachs Schein . . . . . | | | | 80 |
| **Asarum** caudatum, Haselwurz H W shl m w Niedriger Rasen im Schatten (Sommergrün) w | | 6 | | 50 |
| : ! **Asperula,** Bergwaldmeister S sh C tr D F FF | | | | |
| arcadiensis, rosa; silbergraues Laub . . . . | 15 | 5 | 6 | 70 |
| capitata, weiß; grünes nadelfeines Laub . . | 15 | 10 | | 60 |
| nitida, zartrosa; sattgrün, moosartiges Polster | | | | 60 |
| : **Aubrietia,** Blaukissen S sh m tr C F FF | | | | |
| Aubrey Prichard, hellviolettblau . . . . . | 30 | 10 | 4—5 | 60 |
| Dr. Mules, dunkelviolett . . . . . . . . . | | | | 60 |
| Lavender, lavendelblau . . . . . . . . . . | | | | 60 |
| Leichtlini Crimson, karminrosa . . . . . . | | | | 50 |
| Moerheimi, hellrosa . . . . . . . . . . . | | | | 50 |
| Peter Barr, violettrot . . . . . . . . . . | | | | 60 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| rosea splendens, karminrosa | | | | 50 |
| tauricola, hellila, gedrungene Polster | | | | 40 |
| : **Buphthalmum,** Ochsenauge S H sh o fr | | | | |
| salicifolium, gelbe Margeriten-Blüte | 40 | 40 | 7—8 | 50 |
| **Brunella** S B o—m tr | | | | |
| grdfl. rosea, leuchtendrosa; dichte Aehren | 30 | 20 | 7—8 | 40 |
| Webbiana, blauviolett | | | | 50 |
| : **Campanula,** Glockenblume | | | | |
| pusilla, kleine hellblaue Glöckchen S B ssh o—m tr C F ww | 30 | 10 | 6—7 | 50 |
| alba, weiß | | | | 50 |
| tiroliensis, etwas größere, dunkelblaue Glöckchen | | | | 50 |
| pallida, blaßblau | | | | 50 |
| carpathica, lila; bildet dichte Büsche, S B o | 30 | 30 | 7—8 | 40 |
| Riverslea, blau; schalenförmige Blüten | | | | 60 |
| White Star, weiß | | | | 60 |
| Portenschlagiana, S B sh o F FF w dunkelblau | 30 | 10 | 6—7 | 60 |
| ! garganica, B C FF, Blütenranken mit blauen sternigen Blüten | 25 | 6 | | 60 |
| ! elatinoides, S—B sh C FF, blau | | | | 150 |
| ! velutina, S—B, zart rosa gelbweiß | 25 | 30 | | 80 |
| ! villosa, niederliegende Blütenranken blaue Sternblüten, FF | 30 | 8 | | 70 |
| ! § saxifraga, Csh D FF, tieflila | 15 | 8 | 4 | 70 |
| ! Steveni, niedrige Polster, Blütenstiele ca. 20 cm., hellilablau, S B sCh | 15 | 5 | 6 | 80 |
| ! thyrsoidea carnica, S B Csh tr, gelbe Blütenkolben, erhält sich durch Aussaat | 10 | 20 | 6—7 | 70 |
| ! longistyla, mit großen lilablauen Glocken | 30 | 30 | 6 | 50 |
| § van Houttei, sehr große dunkelblaue Glocken S B Csh o tr | 30 | 40 | 6—7 | 70 |
| glomerata dahurica, S B o—m w Blüten in Knäueln, violett | w | 40 | | 50 |
| superba, von kräftigerem Wuchs | | | | 60 |
| latifolia, sehr große dunkelviolette Glocken | 40 | 100 | | 60 |
| persicifolia, S B shl m, große weit geöffnete blaue Blüten | 30 | 80 | | 50 |
| alba, weiße Blüten | | | | 50 |
| Wilsonii, dunkelviolett, großblumig | 20 | 10 | 6 | 60 |
| **Cardamine,** Wiesenschaumkraut S B sh f m | | | | |
| : pratensis fl. pl., zart weißlila; gefüllt blühend | 15 | 30 | 4—5 | 50 |
| : **Carlina,** Wetterdistel SS tr C F | | | | |
| caulescens, silberweiße große Korbblüte | 45 | 30 | 7—8 | 50 |
| : **Centaurea** montana, Kornblume S om tr große blaue Blüten | 40 | 40 | 6—7 | 50 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| : **Centranthus** ruber coccineus S tr k | | | | |
| leuchtendrot blühende Spornblume . . . . . | 70 | 80 | 7—8 | 50 |
| : **Ceratostigma** plumbaginoides, Bleiwurz | | | | |
| SS sh o tr D T | | | | |
| tiefblaue Blüten; dunkelgrüner Laubbusch . . | 40 | 25 | 9-10 | 60 |
| : **Chrysopsis** villosa Rutterii | | | | |
| SS shC tr o F FF | | | | |
| gelbe Strahlenblüten; reichblühend . . . . . | 30 | 15 | 6—8 | 60 |
| **Chrysanthemum** indicum SS tr T | | | | |
| Pompon-Chrysanthemum | | | | |
| Altgold, bronzegelb . . . . . . . . . . | 45 | 50 | 8—9 | 60 |
| Anastasia, lila karminrosa . . . . . . . | | | 9-10 | |
| Herbstbrokat, rotbraungolden . . . . . | 50 | 70 | | |
| Miss Selby, Creme-rosa . . . . . . . . | 45 | 50 | 8—9 | |
| Rehauge, tief rehbraun . . . . . . . . . | 60 | 80 | 10 | |
| Schnee-Elfe, reinweiß . . . . . . . . . | 60 | 80 | 10 | |
| Mittelgroßblumige Chrysanthemum | | | | |
| Goldperle, goldbraun . . . . . . . . . . | 50 | 60 | 9-10 | |
| Bretagne, rosa . . . . . . . . . . . . . | 60 | 80 | | |
| Normandie, hellrosa . . . . . . . . . . | | | | |
| bronce, helles Goldbronze . . . . . . | | | | |
| Ruby King, leuchtendrotbraun . . . . . | 60 | 60 | | |
| Ceddi Mason, einfach tiefrot | | | | |
| mit gelber Scheibe . . . . . . . . . | 50 | 50 | | |
| : **Cerastium** Columnae, Hornkraut | | | | |
| SS o m tr w R | | | | |
| weiße große Blüten; silberweißer Rasen . . . | w | 10 | 5 | 40 |
| **Cimicifuga,** Silberkerze Sf B H h m f | | | | |
| cordifolia, rahmweiße, aufrechte Blütenrispen | 70 | 80 | 8 | 80 |
| japonica, weiß . . . . . . . . . . . . . | 80 | 90 | 9-10 | 80 |
| : **Codonopsis,** Glockenwinde | | | | |
| S B sh o tr C F | | | | |
| clematidea, hellblau | | | | |
| Blütengrund auffallend gezeichnet . . | 25 | 45 | 7—9 | 50 |
| silvestris, hellblau; rankende Sprossen . . . | | | | 60 |
| lanceolata, Triebe rankend ca. 100 cm | | | | |
| große Blüten . . . . . . . . . . . . | | | | 80 |
| **Coreopsis,** Mädchenauge S B o | | | | |
| : verticillata, zierliche hellgelbe Blüten | | | | |
| feingeschlitztes Laub . . . . . . . . | 35 | 60 | 7—8 | 70 |
| : **Cortusa,** Matthioli, Heilglöcklein | | | | |
| B H sh m f | | | | |
| primelartige, hängende karminrote Blüten . . . | 20 | 20 | 5—6 | 50 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blütezeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| **Corydalis,** Lerchensporn | | | | |
| lutea, B H m f HFF, gelb; Dauerblüher zierliches Laub | 40 | 25 | 5—9 | 50 |
| § alba, weiße Blüten | | | | 70 |
| § cava, weiß; Blätter ziehen im Sommer ein H W o | 15 | 25 | 5 | 30 |
| **Cotula** squalida, Zwergkamille S B H sh m ww Z Laub farnartig fein gefiedert | w | 6 | | 40 |
| : ! **Cotyledon** (Umbilicus), Nabelkraut S tr C FF | | | | |
| chrysantha, blaßgelb Hauswurz ähnliche Rosette | 10 | 10 | 7—8 | 50 |
| simplicifolia, überhängende Blütenrispen | 15 | 15 | 7 | 60 |
| : **Crucianella** stylosa S tr F FF Blütendolden leuchtendrot; dichtrasig, üppig wachsend | 60 | 15 | 6—8 | 50 |
| : **Cyclamen,** Alpenveilchen sh tr D B—H | | | | |
| europaeum, karminrosa Knollen ca. 6 cm tief pflanzen | 15 | 10 | 8—9 | 40 |
| neapolitanum, großblättrig, silber gezeichnet Knollen ca. 15 cm tief pflanzen | | | 9 | 60 |
| **Delphinium,** Rittersporn S m B | | | | |
| Belladonna Hybriden Sofortiger Rückschnitt nach dem Verblühen, bringt reiche Nachblüte | | | | |
| Andenken an Aug. Koenemann großblütig, tiefblau | 70 | 120 | 7 | 100 |
| Arnold Böcklin, enzianblau | | | | 80 |
| Capri, zart himmelblau | | | | 80 |
| Lohengrin, preußischblau | | | | 100 |
| Moerheimi, weiß | | | | 90 |
| Tankred, dunkelkobaltblau | | | | 120 |
| Widukind, reinblau | | | | 100 |
| Lamartine, dunkelblau etwas niedriger im Wuchs | | | | 80 |
| Hybriden | | | | |
| Mikie Ruys, rahmweiß; halbgefüllt | 70 | 90 | | 150 |
| Theodora, kornblumenblau m. brauner Mitte | | | 7—8 | 80 |
| van Veen's Triumph, zartrosalila halbgefüllt | | | 7 | 200 |
| Zuster Lughten, dunkelviolett; gefüllt | | | | 80 |
| : tatsinense, enzianblau S sh o tr | 35 | 40 | 6—7 | 70 |
| : § nudicaule, scharlachrot SS sh tr T | 20 | 25 | | 60 |
| : **Dianthus,** Nelke. Sandige Rasenerde mit Schotter, wenig Humus; sonnige Lage, trockener Standort C F FF | | | | |
| ! inodorus, kleine tiefrosa Blüten | 10 | 8 | 5—6 | 50 |
| ! frigidus, kleine tiefrosa Blüten | | | | 50 |
| ! neglectus, größere karminfarbige Blüten | | | | 60 |

| | | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|---|
| | caesius, weiß bis rosa, dunkelrosa . . . . . | 15 | 10 | | 50 |
| | integer grdfl., weiße runde Blüten . . . . . | 30 | 15 | | 50 |
| | strictus, weiß; leicht gekerbt . . . . . . . | | | | 50 |
| | suavis, tiefgezähnte, weiße Blüten . . . . . | | | | 50 |
| | Sternbergii . . . . . . . . . . . . . . . | | | | 60 |
| ! | Noeanus . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | 60 |
| ! | fallax . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | 100 |
| | Requienii . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | 50 |
| | arenarius, feingefranste, starkduftende, weiße Blüten . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 15 | | 50 |
| | deltoides, üppig wachsend leuchtendrote Blüten . . . . . . . . . | 40 | 20 | | 50 |
| | vaginatus, karminrote Blüten in dichten Dolden auf 40 cm hohen Stielen . . . . . . | 15 | 10 | | 50 |
| | superbus, shC, die größte und zierlichst gefranste Blüte . . . . . . . . . . . | 30 | 25 | | 50 |
| :! | alpinus, shlC, große karminrote Blüte auf kurzem Stiel . . . . . . . . . . | 15 | 8 | | 50 |
| | **Dicentra** spectabilis, Flammendes Herz S B m . . . . . . . . . . . . . | 70 | 70 | 5—6 | 70 |
| | **Dodecatheon,** Götterblume B H W sh m f zieht nach der Blüte ein | | | | |
| | Meadia, weiße oder karminrote cyclamenähnliche Blüten auf hohem Stiel . . . | 10 | 10 | 5—7 | 70 |
| | radicatum, niedriger, hellrosakarmin . . . . | | | | 70 |
| | **Doronicum,** Gemswurz S B o – m nicht zu trocken | | | | |
| : | caucasicum, gelbe Margeriten-Blüten, früheste | 30 | 35 | 4 | 50 |
| : | Columnae, 14 Tage später erblühend . . . | 35 | 45 | 4—5 | 50 |
| | plantagineum excelsum, B m tr—f langstielige, größte Blüte . . . . . . | 40 | 00 | 5 | 40 |
| :! | **Draba,** Hungerblümchen S B shC tr F | | | | |
| | aizoides, gelb; kleine starre Rosetten . . . . | 8 | 5 | 3 | 50 |
| | laxa, weiß; lockere Polster . . . . . . . . . | 12 | 10 | 4—5 | 50 |
| : | **Dryas,** Silberwurz S shC tr k F R | | | | |
| | octopetala, weiß; Blüten und Fruchtstand den Anemonen gleichend. Ueberzieht die Felsen flach wachsend . . . . . . . | w | 10 | 5—9 | 80 |
| | Sündermannii . . . . . . . . . . . . . . | | | | 80 |
| : | **Epilobium,** Weidenröschen S B H sh f w | | | | |
| | Fleischerii, Blüte tiefrosa schmales zierliches Laub . . . . . . | 40 | 30 | 7—9 | 60 |
| : | **Epimedium,** Sockenblume B H W sh m | | | | |
| | sulfureum, gelb; zierliche Blüten; besonders | 30 | 30 | 4—5 | 70 |
| | violaceum, lila; schöne Belaubung . . . . | | 20 | | 70 |
| | **Erigeron,** Feinstrahl S m. Den Astern ähnlich erblühen sie im Juni | | | | |
| : | Andersonii, lilablau; dichter frischgrüner Rasen | 30 | 10 | 5—6 | 40 |

| | | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|---|
| : | Asa Gray, blasses gelb; feinstrahlig S sh tr | 20 | 20 | 6 | 60 |
| | hybr. Quakeress, mattrosalila . . . . . . . | 60 | 60 | 6—7 | 50 |
| | mesagrande speciosus, dunkellila . . . . | 50 | 50 | | 50 |
| | speciosus semiplenus, lavendelblau halbgefüllt . . . . . . . . . . . . . | 50 | 50 | | 50 |
| | Abgeblühte Stiele sofort entfernen, wodurch reiche Nachblüte erfolgt | | | | |
| : | **Erica** carnea, Schneeheide S sh (Moorerde) rosa . . . . . . | 25 | 25 | 2-4 | 70 |
| : | **Erinus** hispanicus, Leberbalsam B H sh tr C F karminrosa; lockere Polster . . . . . . . . | 15 | 19 | 5-6 | 50 |
| : | **Eriophyllum** caespitosum SS shC tr F FF hellgelbe Strahlenblüten; grauweißfilziges Polster | 35 | 15 | 5—8 | 60 |
| : | **Erodium,** Reiherschnabel S m, wenig Humus, tr | | | | |
| | Manescavii, magentarot; feingeteiltes Laub . | 50 | 40 | 6—8 | 70 |
| | **Eryngium,** Edeldistel SS o tr | | | | |
| | alpinum, zierlich geschlitzte Blütenhüllen stahlblau . . . . . . . . . . . . . | 40 | 70 | 6—7 | 80 |
| | hybr. Juwel, dunkel stahlblau . . . . . . | | | | 80 |
| | Violetta, rötlichviolett . . . . . . . | | | | 80 |
| :! | **Erysimum,** Schotendotter S sh tr C F FF | | | | |
| | helveticum, hellgelbe Kreuzblüte . . . . . | 10 | 10 | 5-6 | 50 |
| | pachycarpum, orange; frischgrünes Polster | 30 | 15 | | 50 |
| : | **Euphorbia,** Wolfsmilch S sh o tr | | | | |
| :! | capitulata, w C F, gelb; kleinblättrig kriechende Triebe . . . . . . . . . . | 30 | 5 | 4-5 | 70 |
| | myrsinites, C F FF, lichtgelb Triebe niederliegend, starrblättrig . . | 35 | 15 | 5-6 | 60 |
| | polychroma, leuchtend gelbe Blütensträuße . | 70 | 60 | 4-5 | 70 |
| | **Filipendula** (Spiraea), Spierstaude | | | | |
| : | hexapetala fl. pl., weiße Blütensträuße Blütenstiel ca. 50 cm . . . . . . . . | 30 | 15 | 7 | 50 |
| | rubra venusta magnifica, leuchtend rosarote Blütensträuße, S B H f (Torfmull) . . | 120 | 160 | | 80 |
| | Ulmaria fl. pl., weiße, gefülltblühende Mandelspiraea . . . . . . . . . . . | 70 | 80 | | 70 |
| : | **Fritillaria** imperialis, Kaiserkrone S B sh m . . . . . . . . . . | 45 | 70 | 5 | 80 |
| : | **Festuca** glauca, blaugrüner Schwingel S sh tr C F kurzrasiges Ziergras . . . . . . . . . . . | 12 | 10 | | 30 |
| | **Galega,** Geissraute S shl m f | | | | |
| | officinalis Duchess of Bedford, blauweiße Schmetterlingsblüte . . . . . . . . . | 80 | 80 | 7—8 | 70 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| officinalis Hartlandi, höher wachsend etwas größere Blüten | 80 | 100 | | 70 |
| : **Genista,** Felsginster SS tr d C F | | | | |
| tinctoria fl. pl., dichtgefüllte gelbe Blüten | 50 | 15 | 6 | 70 |
| : **Gentiana,** Enzian | | | | |
| acaulis, S B shl k, kurz aufrechtsitzende große Blüte | 15 | 8 | 5 | 100 |
| § angustifolia | | | | 150 |
| Farrerii, C shl f B, reinstes hellblau; feinlaubig | 20 | 10 | 9-10 | 250 |
| sino-ornata, shl f N B, leuchtend tiefblau Triebe niederliegend | | | | 200 |
| Lagodechiana, S—B shC f, leuchtendblau große Blüte | 20 | 15 | 8—9 | 100 |
| § dahurica, S m shl, dunkelblau | | | | 150 |
| lutea, B H moorig—lehmig; gelber Enzian entwickelt sich erst nach Jahren zu voller Wirkung | 60 | 80 | 7—8 | 80 |
| asclepiadea schistocalyx, Schwalbenschwanz-Enzian; feuchthumoser, kräftiger Boden, B—H | 35 | 50 | 7—8 | 80 |
| tibetica, S m tr—f, weiß in kopfigen Dolden großblättrig | 30 | 30 | 7—8 | 70 |
| cruciata } S m tr—f, blau; großblättrig | | | | 70 |
| phlogifolia } S m tr—f, blau; großblättrig | | | | 70 |
| **Geranium,** Storchschnabel S B s—m f | | | | |
| ibericum platypetalum, blauviolett | 60 | 60 | 6—7 | 50 |
| : sanguineum, magentarot niederliegende Triebe, S d C F | 35 | 10 | | |
| : **Geum,** Nelkenwurz S—B sh m f | | | | |
| bulgaricum, goldgelb; große Blüten | 40 | 30 | 5—6 | 60 |
| sibiricum hort., leuchtend dunkelorange | 35 | 25 | | 50 |
| rivale Leonards var., kupfrigrosa nickende Blumen | | | 6 | 50 |
| triflorum, hellrosa, schönes Laub | 35 | 30 | 6 | 80 |
| : **Globularia,** Kegelblume S ssh tr C F | | | | |
| trichosantha, weißblaue Blüten; kleinrasig Stiele ca. 25 cm | 25 | 8 | 5—6 | 40 |
| : **Gypsophila,** Schleierkaut S o tr C F | | | | |
| paniculata fl. pl., weiß gefüllt | 80 | 70 | 7—8 | 100 |
| Ehrlei (Bristol Fairy), reinweiß Wuchs und Blüte größer | 90 | 90 | | 200 |
| cerastioides, FF, kurzgestielte, große Blüte | 15 | 6 | 5—6 | 50 |
| repens, weiß; kriechend, FF | 45 | 10 | 6—7 | 50 |
| rosea, rosa | | | | 50 |
| monstrosa, w, höher uud üppiger | 60 | 25 | | 50 |
| :! **Hedraeanthus,** Büschelglocke S tr D C FF | | | | |
| dinaricus, dunkellila; Blütenstiel 3 cm Zwergpolster | 8 | 5 | 5—6 | 80 |
| pumilio, Blüten schaftlos | 8 | 3 | | 80 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| : **Helianthemum,** Sonnenröschen SS o tr sh C F FF | | | | |
| In Ostlage Winterschutz, Laub und Fichtenreiser | | | | |
| album oculatum, einfachweiß . . . . . . | 35 | 20 | 6—9 | 50 |
| dunkelgoldgelb, mit brauner Mitte . . . . | | | | 50 |
| hyssopolifolium, einfachrot . . . . . . . | | | | 50 |
| sulphureum, einfachgelb . . . . . . . . . | | | | 50 |
| fl. pl., gefülltgelb . . . . . . | | | | 50 |
| Rose Queen, einfachrosa . . . . . . . . . | | | | 50 |
| : **Helichrysum,** Strohblume SS ssh tr C | | | | |
| ! bellidioides, weiß; sehr zierlich, T . . . . . | 30 | 10 | 7—8 | 60 |
| lanatum, gelb; w . . . . . . . . . . . . | 50 | 20 | 6—7 | 50 |
| **Helenium,** Sonnenbraut S m | | | | |
| autumnale (Gartensonne), goldgelb mit brauner Mitte . . . . . . . . . . . | 50 | 120 | 8—9 | 50 |
| pumilium magnificum, goldgelb, einfarbig | 60 | 60 | 7—8 | 50 |
| : Crimson Beauty, rotbraungolden | 50 | 50 | | 80 |
| Riverton Gem., goldlackfarben . . . . . . | 60 | 120 | 8—9 | 50 |
| rubrum superbum, goldlackfarben 14 Tage später erblühend . . . . . . | | | | 50 |
| **Heliopsis,** Sonnenauge S m | | | | |
| scabra imbricata, gefüllt, dunkelgoldgelb . | 50 | 80 | 7—9 | 60 |
| : **Helleborus,** Christrose B H W sh (nahrhaft) | | | | |
| niger, im Winter blühend, weiß . . . . . . | 50 | 40 | 2—3 | 120 |
| hybridus, mattrot . . . . . . . . . . . | | | | 90 |
| **Hemerocallis,** Taglilie S m f | | | | |
| Aureole, dunkelgoldgelb . . . . . . . . . . | 45 | 60 | 7 | 60 |
| citrina, hellblaßgelb; schlanke Blütenform . . | | 90 | 7—8 | 120 |
| hybr. Sovereign, tiefgelb . . . . . . . . . | | 50 | 7 | 60 |
| luteola major, hellgelb . . . . . . . . . | | 90 | | 60 |
| : **Hepatica** triloba, Leberblümchen B H W shl k . . . . . . . . . | 20 | 10 | 3—4 | 50 |
| **Heracleum,** Bärenklaue S B m f | | | | |
| Mantegazzianum, große weiße Schirmdolden üppiges Blattwerk . . . . . . . . . | 150 | 180 | 7—8 | 80 |
| : **Heuchera,** Purpurglöckchen S B mh | | | | |
| Blütenrispen bis 50 cm Höhe, niedrige dichte Büsche . . . . . . . . . . . . . . | 25 | 15 | 6—7 | |
| Feuerregen, feurigrot . . . . . . . . . . . | | | | 70 |
| brizoides gracillima, zartrosa; zierlich . . | | | | 70 |
| sanguinea, leuchtendrot . . . . . . . . . . | | | | 50 |
| Shirley, scharlachrot . . . . . . . . . . | | | | 50 |
| : **Hutchinsia,** Gemskresse B H sh f C | | | | |
| alpina, weiß; Blüte und Laub zierlich . . . . | 20 | 8 | 5—7 | 50 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| : **Hieracium** rubrum, leuchtend orangerotes Habichtskraut S ssh tr w Blütenstiel 40 cm . . . . . . . . . . . . . | 30 | 6 | 7—8 | 50 |
| : **Hypericum,** Hartheu SS ssh tr | | | | |
| patulum Henryi, große gelbe Blütenschalen Strauch, L . . . . . . . . . . . . . | 60 | 70 | 7—9 | 100 |
| olympicum, goldgelb; zierliches Laub C F FF T | 30 | 15 | | 50 |
| repens, w, kräftiger wachsend, C F FF T . . | | | | 50 |
| : **Iberis,** Schleifenblume SS sh o tr C F FF immergrün | | | | |
| sempervirens, Elfenreigen, reinstes weiß stärkster Wuchs . . . . | 35 | 25 | 5 | 60 |
| Schneeflocke, blendendweiß | 35 | 20 | | 50 |
| Weißer Zwerg, zierlicher dicht gedrungen . . . . | 30 | 20 | | 50 |
| **Iris,** Schwertlilie | | | | |
| germanica, S m, nicht zu feucht . . . . . | | | | |
| Caprice, weinrotviolett . . . . . . . . . . | 30 | 60 | 6 | 60 |
| Eckesachs, lavendelblau—hellpurpurviolett | | 80 | | 70 |
| Flammenschwert, goldgelb—samtbraun . | | 70 | | 150 |
| Goldcrest, seltene blaue Tönung, gelber Bart | | 60 | | 230 |
| Loreley, lichtgelb—tiefblau, gelb gerändert | | 60 | | 80 |
| Mad. Chereau, milchweiß, blau geadert . | | 120 | | 50 |
| Mrs. H. Darwin, wachsartig weiß lila geadert . . . . . . . . . . . . . | | 60 | | 50 |
| Rheintraube, reinhellblau—tiefpurpurviolett | | 80 | | 100 |
| Richard II., weiß-schwarzpurpur . . . . | | 60 | | 500 |
| Riese von Cönnern, zart hellblau . . . | | 80 | | 70 |
| Pullach, hell und dunkellila . . . . . . . | | 70 | | 50 |
| : interregna | | | | |
| Frithjof, hellavendel—veilchenblau . . . | | 40 | 5 | 50 |
| Gerda, cremegelb . . . . . . . . . . . | | | | 50 |
| Walhalla, lilalavendel—samtigweinrot . . | | | | 50 |
| : pumila hybrida, S sh tr | | | | |
| aurea, reingelb . . . . . . . . . . . . . | | 20 | 4—5 | 60 |
| coerulea, hellblau . . . . . . . . . . . | | 15 | | 50 |
| cyanea, dunkelblauviolett . . . . . . . . . | | 20 | | 40 |
| Die Braut, reinweiß . . . . . . . . . . | | 30 | | 60 |
| formosa, veilchenblau—violett . . . . . | | 30 | | 50 |
| Princess Victoria Louise, hellblau . . . | | 25 | | 60 |
| **Verschiedene** Iris-Arten | | | | |
| Güldenstädtiana, S ff m, weiß schmalblättrige Blüten . . . . . . . | | 80 | 6—7 | 80 |
| graminea (Pflaumeniris) hellviolett, S m | | 30 | 5—6 | 40 |
| Ochroleuca gigantea, S f Elfenbeinweiß—gelb . . . . . . . . | | 100 | 7 | 80 |
| orientalis Snow Queen, weiß; m f S . | | 50 | 6 | 50 |
| sibirica, hellblau, S ff f . . . . . . . . | | 70 | | 50 |
| alba, weiß . . . . . . . . . . | | | | 50 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| sanguinea, dunkel samtigweinrot, gelber Bart . . . . . . . . . . . . | | 70 | 6—7 | 80 |
| Monspur, lichtblau, gelber Bart . . . . . | | 100 | 7—8 | 80 |
| Monnieri, goldgelb . . . . . . . . . . . | | 110 | | 70 |
| : **Incarvillea,** Freilandgloxinie SS ssh tr L T | | | | |
| Delavay grdfl. karminrosa, gelber Schlund . | 25 | 35 | 5—6 | 60 |
| : **Inula** ensifolia, Zwergalant, S o tr gelbe Sternblüten . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 20 | 7-8 | 50 |
| : **Jasione** humilis, Blaukopf S ssh tr w blaßblaue Blüten auf schlanken Stielen; grüner Rasen . . . . . . . . . . . . | 30 | 10 | 6—7 | 50 |
| : **Lavandula** vera, Lavendel SS o tr C F k silbergrauer Busch . . . . . . . . . . . . . . | 35 | 30 | 6—7 | 50 |
| **Leucanthemum maximum** Sommermargerite S m tr | | | | |
| Etoile d'Anvers, große weiße Blumen . . . | 70 | 60 | 7 | 60 |
| : **Leontopodium,** Edelweiß S shl C F FF k d | | | | |
| hybr. Amrheinii, große weiße Sterne . . . | 20 | 20 | 6—7 | 50 |
| sibiricum, regelmäßige, große Sterne . . . . | | | | 50 |
| **Liatris,** Prachtscharte S f m | | | | |
| spicata, purpurne Blütenkerzen . . . . . . | 30 | 60 | 7—8 | 70 |
| **Lilium,** Lilie. Stehende Nässe meiden! | | | | |
| : umbellatum incomparabile, orangerote Feuerlilie S B m . . . . . | | 50 | 6—7 | 100 |
| : § croceum, Safranlilie, aufrechte Kelche S B m | | 60 | 6 | 100 |
| candidum, weiße Madonnenlilie S B . . . . | | 100 | 6—7 | 70 |
| : Martagon, matt braunrot, dunkel gepunktet S B H W . . . . . . . . . . . . | | 100 | 6—7 | 60 |
| lancifolium roseum, hellrosa dunkel punktiert B L sh . . . . . . | | 80 | 8—9 | 100 |
| tigrinum, Tigerlilie S B . . . . . . . . . | | 80 | 7—8 | 50 |
| : **Linaria,** Leinkraut B H sh tr o C F w Z | | | | |
| pallida, lila Blüten; grüner Blattrasen . . . . Nur für große Flächen . . . . . . . | | 5 | 5—9 | 40 |
| : **Linum,** Lein S o ssh tr C F | | | | |
| ! alpinum, blau; graciöse, überhängende Triebe | 30 | 15 | 6—8 | 50 |
| ! hologynum, blau; leicht hängende Triebe . . | | 30 | | 50 |
| altaicum, blau; aufrechter Wuchs . . . . . | | 40 | | 50 |
| : **Lithospermum,** Steinsame B H sh m | | | | |
| purpurcoeruleum, kleine hellblaue Blüten wurzelnde Triebe, dunkles Laub. Nur für große Flächen . . . . . . . . . | | 30 | | 50 |
| : ! fruticosum Heavenly Blue, kleiner niederliegender Strauch mit hellreinblauen Blüten B sh D C FF . . . . . . . . | 25 | 10 | 6 | 100 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| **Lupinus** polyphyllus S B m | | | | |
| dunkelblaue Garten-Lupine | 70 | 80 | 6–7 | 50 |
| Moerheimi, rosa | | | | 80 |
| **Lychnis** viscaria splendens fl. pl. S o | | | | |
| gefüllte Pechnelke, leuchtend karminrote dichte Blütenrispen, Stiel 30 cm | 25 | 15 | 6—7 | 40 |
| **Lysimachia,** Weiderich S B BW w | | | | |
| cletroides, weiße Blütenähren | 60 | 60 | 7–8 | 50 |
| **Lythrum,** Blutweiderich S H m f | | | | |
| salicaria roseum superbum, dichte rosarote Aehren | 70 | 100 | 7—8 | 50 |
| virgatum Rose Queen, zierlicher im Wuchs und lilarosa Blüte | 50 | 80 | | 50 |
| : **Mimulus,** Gauklerblume S B f (Torfmull) T | | | | |
| luteus cupreus, große gelbe Blüten bräunlich punktiert | 40 | 40 | 6–8 | 50 |
| :! **Moltkia** petraea S—B sh D FF T | | | | |
| coerulea—blaue Blüten; graugrünes Laub | 15 | 25 | 5—7 | 150 |
| : **Mühlenbeckia** axillaris B–H hh | | | | |
| kriechendes Moorsträuchlein | 35 | 5 | | 100 |
| **Monarda,** Etagenblume S m f | | | | |
| didyma Cambridge Scarlet, scharlachrote Lippenblüten | 60 | 70 | 6—8 | 60 |
| : **Nepeta,** Katzenminze S o sh tr C F | | | | |
| Mussinii, hellila; silbergraues Laub | 30 | 25 | 5—8 | 40 |
| : **Oenothera,** Nachtkerze | | | | |
| glabra, goldgelb; braunrotes Laub S m | 40 | 50 | 6–7 | 50 |
| missouriensis, große gelbe Trichterblume Triebe niederliegend S shl m tr F | 50 | 15 | 6—8 | 50 |
| ! marginata, große weiße Blume, stark duftend nur für größere Plätze und geschützte Lage S sh tr C T ww | | 15 | | 80 |
| pumila shl tr S B, kleine hellgelbe Blüten | 15 | 10 | 6—8 | 40 |
| **Omphalodes,** Gedenkemein B H W sh | | | | |
| : cappadocica, tiefblau; zierlicher Busch | 20 | 20 | 4—5 | 60 |
| verna, m f w, leuchtend blau; frisch grün | 30 | 15 | | 40 |
| :! **Onosma,** Lotwurz SS sh tr D C F FF | | | | |
| stellulatum, weißlich—hellgelb | 30 | 20 | 6—7 | 60 |
| cassium, weiß | | | | 60 |
| silbergraues Laub, nickende, krugförmige Blüten | | | | |
| :! **Oxalis,** Sauerklee B sh o C D T | | | | |
| adenophylla, kurz aufrecht sitzende, zart rosa Blüten | 15 | 10 | 6—8 | 60 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| **Oxytropis** campestris, Fahnenwicke hellgelbe Schmetterlingsblüten gefiederte, grundständige Blätter . . . | 20 | 10 | 6—7 | 50 |
| **Papaver,** Mohn | | | | |
| alpinum, S B sh C F, zierlichster Mohn in rosa, weiß und gelb . . . . . . . . | 10 | 5 | 6—9 | 40 |
| nudicaule, Islandmohn, S B sh m gelb, orange Blütenstiel 25 cm . . . | 15 | 12 | 6—9 | 40 |
| orientale Wunderkind, karminrosa größte Blüten, S m . . . . | 50 | 40 | 6—8 | 120 |
| Württembergia, dunkel glühendrot | | | | 70 |
| **Paeonia,** Pfingstrose. Sonnige, freie Lage, nahrhafter Boden | | | | |
| officinalis rubra plena, gefüllt dunkelrot . | 60 | 60 | 5—6 | 100 |
| rosea plena, rosa — rot . . . . | | | | 100 |
| sinensis, gefüllt blühen: | | | | |
| festiva maxima, reinweiß . . . . . . . | | | 6 | 150 |
| Mm. Charles Lévêque, nelkenrosa . . . | | | | 150 |
| Triomphe de l'exposition de Lille silberrosa . . . . . . . . . . . . . . | | | | 150 |
| Felix Crousse, glänzend feurigrot . . . | | | | 150 |
| : tenuifolia, feinzerschlitztes Laub einfach rosa oder rot . . . . . . . . | 50 | 40 | 5—6 | 90 |
| fl. pl., gefüllt rot . . . . . . . . . . . . | | | | 150 |
| :! **Paronychia,** Mauermiere SS tr ssh C F R | | | | |
| argentea } Felsen bekleidende | 30 | 3 | | 50 |
| serpyllifolia } flachste Polster | | | | 50 |
| **Phlox,** Flammenblume S B o sh m | | | | |
| : Niedrige Frühlingsblüher | | | | |
| amoena, karminrot; lockerer Rasen . . . | 30 | 10 | 5 | 50 |
| divaricata canadensis, hellblau . . . . | 24 | 30 | 4—5 | 50 |
| setacea atropurpurea, keineWinternässe,F C | 30 | 10 | 5 | 50 |
| Fairy, zartlila, C F . . . . . . . | | | | 50 |
| G. F. Wilson, zartblau wächst üppig, F C . . . | | | | 50 |
| nivalis, niedrig, schneeweiß, C F . | | | | 50 |
| Schneewittchen, weiß,kräftiger,C F | | | | 70 |
| Nelsoni, lilafarben . . . . . . . | | | | 50 |
| Newry Seedling, malvenfarbig . | | | | 50 |
| Vivid, reinstes rosa; leider sehr schlechter Wachser . . . | | | | 100 |
| Brightness, rosa . . . . . . . . | | | | 50 |
| **Phlox** paniculata Hybriden, Sommerphloxe S m—o | | | | |
| Mia Ruys, weiß . . . . . . . . . . . . | 50 | 50 | 7—8 | 50 |
| Alpenglühen, scharlachrot . . . . . . . . | 60 | 70 | | 70 |
| Campbell, lachsrosa, weißer Spiegel . . . . | | 70 | | 50 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| F. L. Stueben, karminviolett | | 70 | | 50 |
| Hindenburg, kirschrot | | 70 | | 70 |
| Imperator, dunkel karminrot | | 100 | | 70 |
| Laßberg, weiß | | 80 | | 50 |
| Le Mahdi, blau | | 90 | | 50 |
| Mad. P. Dutrie, zartrosa | | 100 | | 50 |
| Schlageter, tiefblutrot | | 90 | | 80 |
| Septemberglut, kirschrot | | 120 | | 50 |
| Württembergia, altrosa | | 80 | | 50 |
| : **Platycodon** (Wahlenbergia) Mariesii grdfl. S m | | | | |
| große, dunkelblaue, schalenförmige Glockenblumen | 40 | 35 | 7—8 | 70 |
| : **Polemonium,** Himmelsleiter S B f | | | | |
| Richardsoni, lichtblaue Schalenblüten | 30 | 50 | 5–6 | 60 |
| : **Polygonum** Knöterich S B m sh C F | | | | |
| affine rosa Aehren; guter Laub-Rasen | 50 | 15 | 7–9 | 50 |
| ! Viviparum, weiß, kleine Aehren | 10 | 10 | | 50 |
| : **Phytheuma,** Teufelskralle S B sh C F | | | | |
| orbiculare, dunkelblaue, runde Blütenköpfe, f | 20 | 30 | 5—6 | 60 |
| Scheuchzerii, lockerer im Wuchs | 20 | 20 | 6 | 60 |
| : **Potentilla,** Fingerkraut S shl m | | | | |
| atrosanguinea, dunkelblutrot | 50 | 30 | 6—7 | 60 |
| hybr. Gibson's Scarlet, scharlachrot | | | | 70 |
| fl. pl., gefüllt, dunkelrot mit gelb | | | | 70 |
| nepalensis Miss Willmott, leuchtendrot | | | | 50 |
| chrysocraspeda, hellgelb; niedrige dichte Polster, C F | 20 | 10 | | 50 |
| villosa, gelb; Laub silberschimmernd, tr C F | | | | 70 |
| fruticosa floribunda, gelb reichblühender Strauch | 60 | 70 | 6–8 | 100 |

## Primeln

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| **Gruppe Auriculastrum** | | | | |
| **Primula** auricula, Garten-Aurikeln B H lehmhaltiger Boden | | | | |
| großblütig, in allen Farben | 15 | 10 | 5 | 40 |
| auricula alpina, goldgelb; B H shl | 10 | 10 | 4—5 | 70 |
| marginata, shh B, lila | 15 | 8 | 5 | 100 |
| clusiana, k d shlC, rosenrot | 10 | 8 | | 70 |
| **Gruppe Sinensis** | | | | |
| **Primula** Veitchi B H W sh | | | | |
| purpurrosa | 20 | 20 | 5—6 | 70 |
| Sieboldii, H W sh L, großblumig, karminrosa mit weißer Mitte. Zieht im Juli ein | 20 | 20 | | 70 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| **Gruppe Vernalis** | | | | |
| **Primula** acaulis alba B H W m . . . . . | 20 | 12 | 3—5 | 40 |
| coerulea, tiefblau . . . . . | | | | 50 |
| veris elatior grdfl., B H W, in Farbenmischung | 25 | 20 | | 40 |
| aurea, leuchtendgelb . . | | | | 50 |
| suaveolens, hängende Blüten, gelb, rot . . . | | | | 40 |
| Juliae, B H shl, karminlila; kriechend . . . | 25 | 5 | 4-5 | 50 |
| Helenae, B—W m, purpurfarbig . . . . . . | 25 | 10 | | 50 |
| Wanda, purpurblau . . . . . . . . . . . | | | | 80 |
| **Gruppe Auriculatae** | | | | |
| **Primula** luteola hybrida, H W shl m f Doldenprimel hellgelb bis lila . . . . . . . . . . | 25 | 25 | 5-6 | 70 |
| rosea grdfl., B H W shl hh ff leuchtendstes karminrosa . . . . . . | 25 | 10 | 4—5 | 50 |
| **Gruppe Capitatae** | | | | |
| ! **Primula** capitata, hellviolett; (B H sh kiesig mit Sphagnum Blüten in gerundeten Köpfchen, Heliotrop-Duft Stiel ca. 25 cm) | 10 | 8 | 6—8 | 70 |
| ! crispata, tiefviolett | | | | 70 |
| ! Mooreana, schwarzlila | | | | 70 |
| denticulata, hl m f B H W, Ballprimel zartlila . . . . . . . . | 40 | 25 | 4—5 | 40 |
| alba, weiß . . . . . . . . . . . | | | | 40 |
| Littoniana, shl f H, unbedingt kühle Lage Blütenstand orchisartig, karminlila Stiel ca. 35 cm . . . . . . . . . . . . | 25 | 15 | 6—7 | 150 |
| ! muscarioides, sh (sehr locker, frisch aber nicht ausgesprochen feucht) B H, orchisartig blaulila; Stiel ca. 25 cm . . . . . . . | 10 | 5 | | 200 |
| **Gruppe Farinosae** | | | | |
| **Primula** scotica B sh f am besten im Rasen der Arenaria rotundifolia dunkellila; zierlich . . . . . . . . . | 5 | 5 | 6—8 | 50 |
| longiflora, gleich voriger; karminlila . . . . | 10 | 10 | | 50 |
| Darialica, B H shl, dauerhaft und reichblühend karminrosa sehr zierlich . . . . . . . | 12 | 10 | 4—5 | 100 |
| sibirica, H shh, zartlila; Stiel ca. 25 cm . . | 15 | 15 | 5—6 | 70 |
| chrysopa, shl (locker) frisch bei guter Drainage zart silberblau; Stiel 25 cm . . . . . | 12 | 6 | | 120 |
| ! conspersa, ebenso zu behandeln, niedrigste Polster, Blütenstiele ca. 20 cm Blüte stark karminrosa . . . . . . . | 10 | 3 | | 150 |
| **Gruppe Nivalis** | | | | |
| **Primula** secundiflora B—W shl f Blüten tiefkarminlila, hängend, Stiel ca. 30 cm | 20 | 10 | 6 | 100 |
| sikkimensis, schwefelgelb stärkster Duft . . . . . . . . . . . . | 25 | 15 | 6 | 50 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| chionantha, Blüten straff in lockerer Dolde; groß, silberweiß unbedingt kühle Lage . . . . . . . | 20 | 15 | 5—6 | 120 |
| **Gruppe Proliferae** | | | | |
| **Etagen- oder Pagodenprimeln** | | | | |
| **Primula** japonica sanguinea H W m f amarantrot; großblütig Stiel 45 cm . . . . . . . | 35 | 25 | 5—6 | 50 |
| rosea, rosa . . . . . . . | | | | 50 |
| Bullesiana, (ebenso) die größte Mannigfaltigkeit in rosa, lila, gelben und roten Farben-Tönungen, Stiel 60 cm . . . . | 40 | 25 | 5—6 | 60 |
| oblanceolata, shl mäßig frisch, B H T, hängende tiefpurpurne Blüten, Stiel 40 cm . . . | 25 | 15 | 6—7 | 80 |
| :! **Ptilotrichium**, dem Alyssum ähnlich, verholzend | | | | |
| spinosum, weiß; runder Busch, silbergrünes Laub, SS tr D FF T . . . . . . . . | 20 | 20 | 6 | 100 |
| **Pyrethrum**, Bunte Margerite S tr o—m | | | | |
| einfach blühen: | | | | |
| Eileen May Robinson, warmes Rosa . . . | 50 | 40 | 5—6 | 100 |
| Hamlet, hellrosa . . . . . . . . . . . . . . | | | | 80 |
| James Kelway, dunkelblutrot . . . . . . . | | | | 80 |
| Strahlenkrone, klarrosa . . . . . . . . . . | | | | 90 |
| gefüllt blühen: | | | | |
| Lord Roseberry, dunkelblutrot . . . . . . | | | | 100 |
| Mad. Ivonne Cayeux, weiß, cremefarbige Mitte | | | | 80 |
| Queen Mary, reinrosa . . . . . . . . . . | | | | 80 |
| **Ramondia**, Gesneraceae H sh (Moorerde) C F FF | | | | |
| pyrenaica, Stiel, straff ca. 10 cm lila-blau; flache Laub-Rosette . . . . | 12 | 3 | 6 | 100 |
| **Ranunculus**, Ranunkel | | | | |
| acer fl. pl., Goldknöpfchen, B m S f . . . . | 40 | 60 | 5—6 | 50 |
| aconitifolius fl. pl., Silberknöpfchen, f m . | | 40 | 6 | 100 |
| : amplexicaulis fl. pl., shl f (moorig) blendend weiß . . . . . . . . . . . | 15 | 25 | 6 | 80 |
| : § gramineus, shl S B, goldgelb . . . . . . . | 15 | 20 | | 70 |
| Rehneltianus, shl S—B, blaßgelb reichblühend . . . . . . . . . . . . | 30 | 40 | 5—6 | 70 |
| :! **Roscoea** cautleoides B sh tr T weich-hellgelb; eigenartige Blüte . . . . . . | 15 | 30 | 6—7 | 200 |
| **Rodgersia**, Blattspiere H W m f | | | | |
| tabularis, weiße Rispen; schildförmige Blätter | 70 | 70 | 7 | 120 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| **Rudbeckia,** Sonnenhut S m | | | | |
| laciniata, Goldball, gelb, gefüllt üppig wachsend | 100 | 180 | 8—9 | 50 |
| nitida, Herbstsonne, einfache, hellgelbe große Blüte | 100 | 190 | 9 | 70 |
| purpurea, lila—rot, olivbrauner Mittelknopf | 50 | 90 | 8—9 | 70 |
| Abendstern, purpurrot | | | | 200 |
| speciosa Newmanni, w, orange mit schwarzer Mitte | 40 | 60 | | 40 |
| : **Sagina** subulata, Sternmoos S F sh f (nicht zu trocken) festes Polster, frischgrün; weiße Sternblütchen | | 5 | 6—7 | 30 |
| : **Santolina,** Heiligenblume SS sh tr o F | | | | |
| tomentosa, gelb; silbergrün | 30 | 40 | 7—8 | 50 |
| **Salix** retusa, kriechende Zwergweide S—H shC f | 40 | 4 | | 100 |
| **Salvia,** Salbei S B shl o—m | | | | |
| nemorosa, violettblau; lange Blütenkerzen | 70 | 70 | 7—8 | 80 |
| : **Saponaria,** Seifenkraut S tr C FF | | | | |
| ocymoides, rosa—karminrot; rasenartig | 50 | 15 | 6—7 | 50 |
| : **Saxifraga,** Steinbrech | | | | |
| :! Gruppe Porphyrion. Zwergige Rasen, wurzelnde Triebchen | | | | |
| oppositifolia grdfl., große fast stengellose, dunkelrote Blüte, B sh Sphagnum C | 15 | 1 | 3-4 | 70 |
| :! Euaizoonia: Rosetten aus ledrig, zungenförmigen Blättchen; Polsterbildend, Blütenrispen meist 10 cm hoch B—H FF | | | | |
| Aizoon minor, sehr kleinrosettig; weiß | | | 5—6 | 50 |
| lutea, hellgelb | | | | 60 |
| Portae, sehr kleinrosettig | | | | 60 |
| balcana | | | | 60 |
| crustata, schmallaubig | | | | 50 |
| cochlearis | | | | 50 |
| Cotyledon, großrosettig; weiße Rispen ca. 50 cm hoch | | | | 60 |
| Hostii | | | | 50 |
| longifolia, ca. 30 cm hoch | | | | 100 |
| :! Kabschia: Zwergige Polster, starre Rosettchen, nadelspitze Blätter B—H sh kiesig F FF | | | | |
| Burseriana | | | 3—4 | 80 |
| apiculata | | | | 60 |
| sancta | | | | 60 |
| Elisabethae | | | | 60 |
| ochroleuca | | | | 80 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| : Dactyloides: moosigschwellende Rasen, überaus reich blühend B—H sh m nicht zu trocken | | | | |
| caespitosa, feinrasig; weiß, 10 cm hoch | 25 | 10 | 4—5 | 40 |
| decipiens, größer und lockerer | | | | 40 |
| grdfl., Blüten groß, weiß | | | | 40 |
| hybr. Blütenteppich, hellrosa | 25 | 15 | | 50 |
| Purpurmantel, karminrosa | | | | 50 |
| magnifica, frisch hellrosa, große Blüte | | | | 50 |
| Teppichkönigin, rosa; sehr niedrig | 10 | 6 | | 50 |
| leptophylla, weiß; verzweigte Stiele 20 cm hoch | 25 | 15 | 6 | 40 |
| : Robertsonia: gedrungene Rosetten, zierliche weiße Blüten in Rispen H shh f C F (Moorerde) | | | | |
| cuneifolia, kleine spatelförmige Blätter | 15 | 3 | 5 | 40 |
| : **Scabiosa** caucasica, Diamant S o—m tr langgestielte Blumen; zart hellblau | 60 | 50 | 6-10 | 80 |
| :! **Schievereckia** Bornmülleri S shC F dichtrasige, graugrün belaubte Felsenkräutlein weiße Blütenträubchen | 20 | 5 | 3-4 | 50 |
| : **Scutellaria,** Helmkraut SS shC F | | | | |
| baicalensis, blauviolette Lippenblüten aufrechter Wuchs | 25 | 40 | 7—8 | 60 |
| orientalis var. alpina, gelb; kriechende Triebe | 35 | 20 | 6—8 | 50 |
| : **Sedum,** Fetthenne, Sonnenmoos S tr C F FF | | | | |
| ! dasyphyllum, weiß; hellgraue niedrigste Polster | 10 | 3 | 7 | 40 |
| Ewersii, dunkelrosa; blaugrün | 25 | 10 | 7—8 | 50 |
| lydium, rosaweiß; grüne dichte Polster | 10 | 6 | 7 | 30 |
| aureum, goldgelb belaubt | | | | 50 |
| glaucum, blaugrün | | | | 30 |
| Middendorfianum, dunkelgoldgelb stark wachsend, R Z | 35 | 10 | | 40 |
| ! pulchellum, hellrosa—karmin; lockere Polser, T | 20 | 10 | | 70 |
| rupestre, gelb; spitzfriemliche Blätter | 25 | 10 | 6—7 | 30 |
| Sieboldii, rosa Dolden blaugrün, niederliegende Triebe | 20 | 8 | 8—9 | 50 |
| ! spathulifolium, weiß; blaugrün, silberbereift | 15 | 8 | 8 | 60 |
| ! purpureum, gelb; dunkelrote Blätter | | | | 60 |
| spurium splendens, karminrot dunkles Laub, R Z | 30 | 10 | 7—8 | 40 |
| spectabile, silberrosa erblühend, karminfarbig nachdunkelnd | 30 | 30 | 8—9 | 50 |
| Carmen, dunkelkarminrosa | | | | 50 |
| :! **Sempervivum,** Hauslauch, Dachwurz S tr C FF | | | | |
| Boissieri, triste und Hybriden | | | | 30 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| tomentosum, kleine Rosetten seidenhaarig besponnen . . . . . . . | | | | 40 |
| **Senecio,** Greisenkraut B m f H f | | | | |
| Clivorum, goldgelbe Scheibenblüten große, herzförmige Blätter . . . . . . | 90 | 80 | 7—8 | 80 |
| Wilsonianus, gelb; Blütenrispen ca. 60 cm lang Schaft 150 cm . . . . . . . . . . . | 90 | 90 | | 100 |
| : **Silene,** Alpenleimkraut | | | | |
| ! acaulis, sh, kiesig—Sphagnum d, S C, rosa kurzgestielte Blüten, flache Polster . . | 12 | 3 | 5 - 7 | 60 |
| alpestris, weiß; Stiele 10 cm hoch niedriger Rasen, S sh o w R . . . . | 25 | 5 | 6 | 50 |
| Schafta, S sh tr C FF, leuchtendrosa . . . | 25 | 10 | 8 | 50 |
| : **Sisyrinchium,** Binsenlilie SS sh o tr | | | | |
| anceps, blau; grasähnliche Belaubung . . . . | 12 | 15 | 6 | 40 |
| Bermudianum, etwas größer; violett, T . . | | | 6—8 | 50 |
| **Soldanella,** Alpenglöckchen B sh Sphagnum f | | | | |
| alpina, lila; gefranste Glöckchen . . . . . . | 8 | 6 | 3 | 70 |
| **Solidago,** Goldraute S m, nicht zu feucht Gelbe Blütenrispen | | | | |
| : brachystachya . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 15 | 9 | 50 |
| : elliptica, leichter, aufrechter Wuchs . . . . | 50 | 50 | 8—9 | 50 |
| Shortii, hochwachsend und straffstielig . . . | 80 | 150 | 9-10 | 50 |
| : virgaurea nana, niedriger, dichter, straffer Wuchs . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | 40 | 8—9 | 50 |
| hybr. Frühgold, altgold; breite Rispen . . | 80 | 120 | 7—8 | 50 |
| Goldschleier, goldgelb straff und reichblühend . . . . . . . | | 80 | 8 | 70 |
| **Thalictrum,** Wiesenraute S f B H m | | | | |
| aquilegifolium, federige Blumen, weiß—lila gefiederte Belaubung . . . . . . . . | 60 | 100 | 6 | 50 |
| dipterocarpum, reich verzweigte, elegante Rispen, violettlila . . . . . . . . . . | 50 | 130 | 7—8 | 80 |
| : adiantifolium, zierliches Laub . . . . . . . | 30 | 40 | | 60 |
| : **Teucrium,** Gamander SS o C F | | | | |
| chamaedrys, große Lippenblüten; immergrün | 35 | 30 | 7—8 | 40 |
| montanum, weiß; kriechend . . . . . . . . | 25 | 10 | 7 | 50 |
| ! aureum, gelb; silberweißes Laub, D FF T . . | 20 | 10 | | 60 |
| : **Thymus,** Thymian SS ssh o tr C F d Niedrige, kriechende Polster | | | | |
| serpyllum albus, weiß . . . . . . . . . . | 25 | | 6—7 | 40 |
| coccineus, dunkelrosa . . . . . | | | | 40 |
| splendens, leuchtendrot . . . . | | | | 40 |
| lanuginosus, weißwollige Belaubung . . | | | | 40 |
| vulgaris citriodorus Laub stark duftend, T . . | 35 | 12 | | 40 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| **Tradescantia,** Dreimasterblume S f B | | | | |
| virginiana alba, reinweiß schilfartige Belaubung . . | 40 | 40 | 6—8 | 50 |
| coerulea, leuchtendblau . . . . | | | | 50 |
| rosea, hellilarosa . . . . . . . | | | | 50 |
| : **Trollius,** Goldranunkel S f B m | | | | |
| caucasicus Orange Globe, goldorange . . | 45 | 50 | 5 | 80 |
| hybr. Goldquelle, goldgelb . . . . . . . . | | | | 100 |
| europaeus-Hybriden, hell—dunkelgelb . . | | | | 60 |
| Ledebouri, tieforange; lang hervortretende Honigblätter . . . . . . . . . . . . | 40 | 80 | 6—7 | 100 |
| : § pumilus yunnanensis, glänzend goldgelbe Blütenschalen . . . . . . . . . . . . | 25 | 40 | 7 | 100 |
| : **Tunica** saxifraga, Felsennelke S C FF | | | | |
| kleine rosaweiße Blüten; langtriebiges, duftiges Polster . . . . . . . . . . . . . . | 40 | 15 | 6—8 | 40 |
| : **Veronica,** Ehrenpreis S sh tr | | | | |
| Allionii, dunkelblau; Triebe niederliegend, C FF | 20 | 5 | 5—6 | 50 |
| ! cataractae, SS D FF T, zartweiße, größere Blüten; zierliches, dunkles Laub . . . | 25 | 15 | 6—7 | 60 |
| coerulea glauca, R Z, blaue Blüten silbergraugrünes Laub . . . . . . . . | 40 | 40 | | 70 |
| corymbosa, R Z, blaue Blüten silbergraugrünes Laub . . . . . . . . | 30 | 5 | | 50 |
| filiformis, B, 4 cm hochgestielte, hellblaue Blüten, ww R . . . . . . . . . . . | 30 | 5 | | 40 |
| gentianoides, weißblaue Blütenähre glänzend, grüne Blätter . . . . . . . | 25 | 30 | 5—6 | 50 |
| Hendersoni, hohe tiefdunkelblaue Aehren . . | 50 | 60 | 7—8 | 100 |
| longifolia, leuchtendblaue Blütentrauben . . | 40 | 60 | 6—7 | 50 |
| repens, weiße Blüten über niedrigstem Rasen | 20 | | 4—5 | 40 |
| saxatilis, größere, auffallend blaue Einzelblüten, F . . . . . . . . . . . | 20 | 10 | 6 | 50 |
| saturejoides, rötlichblau; niederliegend . . | | | | 60 |
| spicata, hellila Aehren, verzweigt . . . . . | 40 | 50 | 6—7 | 50 |
| teucrium prostrata alba, reinweiß Blüten übersäete Polster . | 25 | 10 | 5—6 | 50 |
| coelestina, lichtblau . . . . . | | | | 50 |
| coerulea, leuchtendblau . . . | | | | 50 |
| pallida, bläulichweiß . . . . . | | | | 50 |
| rupestris, amethystblau . . . . | | | 6 | 50 |
| Shirley Blue, tiefdunkelblau lange Rispen . . . . . . | 30 | 20 | 6 | 60 |
| **Viola cornuta,** Hornveilchen S B sh | | | | |
| Ausdauernde Stiefmütterchen | | | | |
| G. Wermig, dunkelviolett . . . . . . . . | 30 | 15 | 5—9 | 40 |
| Hansa, große, reinblaue Blüte . . . . . . | | | | 40 |
| gracilis Lord Nelson, tiefpurpurviolett . | | | 4—9 | 50 |

| | Breite cm | Höhe cm | Blüte-zeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| : Folgende Wildveilchen ab Juli lieferbar: | | | | |
| bosniaca, magentarot, B sh . . . . . . . . | | | | 40 |
| lutea, hellgelb, S B etwas frischer Boden . . | | | | 40 |
| gracilis hybr., blau . . . . . . . . . . . . | | | | 50 |
| : **Viscaria** alpina, Pechnelke S sl tr rosa; in dichtblütigen Köpfchen . . . . . . . | 5 | 12 | 6—7 | 30 |
| **Wulfenia** carinthiaca, Kuhritt H F shhl blaue Blütenrispen, immergrüne Belaubung | 25 | 15 | 5—6 | 60 |

## : Freiland-Farne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Adiantum** pedatum, Venushaar B—H f sh . . . . . . . . . . . . | 35 | 30 | | 200 |
| **Asplenium** Trichomanes, kleiner Felsenfarn H FF sh—kiesig . . . . . . | 15 | 10 | | 50 |
| **Blechnum** Spicant, wintergrüner Rippenfarn. H humoser Boden . . . . . | 25 | 20 | | 60 |
| **Cystopteris** fragilis, Blasenfarn. Felsenfarn. B—H . . . . . . . . . . . | 25 | 25 | | 60 |
| **Onoclea** sensibilis w H f—ff hochgestielte Wedel . . . . . . . . . . . . . | 50 | 50 | | 80 |
| **Polystichum** angulare proliferum shh H—B Immergrüne, niederliegende, feingefiederte Wedel | 60 | 25 | | 100 |
| lobatum, wintergrün . . . . . . . . . . . | | | | 80 |
| **Scolopendrium** vulgare, Hirschzunge H f shh . . . . . . . . . | 25 | 40 | | 70 |

## Niedrig bleibende Sträucher

Für Steingärten und Sonderanlagen geeignet, schön im Laub- oder Fruchtschmuck

| | Höhe cm | Blütezeit | Preis Pfg. |
|---|---|---|---|
| **Andromeda** polifolia, S—H hh hellrosa Glöckchen immergrün . . . . . | 30 | 5—6 | 250 |
| **Berberis** buxifolia var. nana rotbraunes Laub . . . . . . | 40 | | 140 |
| Wilsonae, Laub karminrote Herbstfärbung . . . . . . . | 80 | 5—6 | 320 |
| **Ceanothus** Fendleri S Csh F große Blütendolden . . . . . . . | 60 | 6—7 | 250 |
| **Chaenomeles** Maulei alpina Zwergquitte, S sh . . . . . . | 60 | 3—5 | 200 |
| **Clematis** alpina (Atragene) B—H shlC Ranken 25 cm . . . . . . | | | 125 |
| **Cotoneaster** horizontalis S sh F Früchte karminrot . . . . . | | | 225 |
| humifusa, niederliegend Früchte karminrot . . . . . | | | 325 |
| microphylla, kleinblättrig Früchte karminrot . . . . . | | | 200 |
| prostrata, niederliegend Früchte karminrot . . . . . | | | 150 |
| **Crataegus,** Feuerdorn SS o tr Pyracantha Lalandi, Beeren korallenrot . . | 120 | 5—6 | 250 |
| **Cytisus,** Ginster SS tr d albus, weiß blühender Besenginster . . . . . | 120 | 5—6 | 150 |
| praecox, Elfenbeinginster . . . . . . . . . | | | 350 |
| kewensis, Zwergelfenbeinginster . . . . . . | 35 | | 250 |
| **Daphne,** Seidelbast alpina, Csh H, Beeren rot . . . . . . . . . | 40 | 5—6 | 325 |
| Cneorum, Rosmarinseidelbast, S—B Csh F . | 25 | 5—6 | 350 |
| Mezereum, B—H sh Blüten und Beeren dunkelrot . . . . . | 150 | 3—5 | 350 |
| alba, weiß blühend, gelbe Beeren . . . . | | | 350 |
| **Evonymus** kewensis, Zwergspindel niederliegend, immergrün, S—H F | | | 150 |
| radicans vegeta, kriechend . . | | | 275 |
| **Lonicera** nitida S sh T F myrtenähnliches Laub . . . | 120 | | 80 |
| pileata, S sh F, niedrig, ausgebreitet | 50 | | 80 |
| **Lyonia** calyculata S—B H hh immergrün, weiße, hängende Blütenglöckchen | 50 | 4—5 | 200 |

| | Preis RM |
|---|---|
| **Zwerg-Nadelhölzer** | |
| **Abies** | |
| balsamea nana . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.00 |
| **Chamaecyparis** | |
| obtusa nana, Zwergfächercypresse . . . . . . . | 6.00 |
| lycopodioides, dunkelgrüne Zwergform . . . . . | 4.00 |
| Lawsoniana minima glauca, Kugelform . . . . | 4.00 – 6.00 |
| pisifera-pilifera nana, dichtbuschig mit fadenförmigen Zweigen . . . . . | 6.50—9.00 |
| **Juniperus,** Wacholder | |
| chinensis Pfitzeriana, breite Pyramide . . . . . | 4.00—6.00 |
| communis, gemeiner Wacholder . . . . . . . . . | 3.00—5.00 |
| nana, niederliegend . . . . . . . . . . . . . . . | 3.50 |
| Sabina, dunkelgrün; ausbreitend . . . . . . . . . | 4.00—8.00 |
| prostrata, kriechend . . . . . . . . . . . . | 7.00 |
| tamariscifolia, niedrig und breit; bläulich—grün | 6.00 |
| **Picea,** Fichte | |
| exelsa Clanbrasiliana, kegelförmig gedrungen . . | 4.00—6.00 |
| conica, Kegelfichte . . . . . . . . . . . | 6.00 |
| Gregoryana, Zwergform . . . . . . . . . | 3.50—13.00 |
| nana, abgeplattete, dichtzweigige Form . . | 4.00—5.00 |
| nidiformis, Kissen bildende Form mit fächerförmigen Zweigen . . . | 3.50—8.00 |
| Remonti, spitzkegelförmig . . . . . . . . | 4.00 – 6.00 |
| **Pinus,** Kiefer, Latsche | |
| montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.00—12.00 |
| Pumilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.58—8.00 |
| **Thuja,** Lebensbaum | |
| occidentalis Ohlendorffi . . . . . . . . . . . . | 5.50 |
| globosa compacta, dunkelgrüne Kugelform . | 5.50—6.50 |
| recurva nana, rundliche regelmäßige Form . . | 7.00 |

**Gartenfreunde** und Liebhaber schöner und seltener Pflanzen können in meinem 900 qm großen Steingarten, außer den in der Liste genannten Arten, eine große Anzahl zum Teil noch wenig bekannter Stauden kennen lernen.

Die Schmuckwirkung der Stauden kommt in dieser Anlage zu reicher Entfaltung. Mein Steingarten soll zur Anregung dienen und gerne bin ich bereit, die Ausführung von Anlagen dieser Art zu übernehmen.

Ich muß darauf hinweisen, daß die Zusammendrängung der Arbeiten während der Versandzeit eine Sonderausnahme in der Erledigung eines Auftrages unmöglich macht. Ich bitte deshalb, von einer sofortigen Mitnahme ausgewählter Stauden abzusehen. Die Kosten für Fracht und Verpackung sind gering; die gewissenhafte Ausführung eines Auftrages ist vorteilhafter, als überstürzte sofortige Mitnahme, wodurch die Arbeiten im Betriebe überaus gestört werden.

Gustav Ivens, Buchdruckerei, Eutin